

# BluSky 500 WG

## Wrażliwość chwastów w zbożach ozimych:

### Dawka 16 g/ha

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Chwasty wrażliwe        | fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumianek pospolity, ostróżeczka polna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne |
| Chwasty średniowrażliwe | bodziszek drobny, chaber bławatek, komosa biała, mak polny, przetacznik bluszczokowy, rdest powojowaty (rdestówka powojowata)   |
| Chwasty średnioodporne  | przytulia czepna  |
| Chwasty odporne         | jasnota purpurowa   |

### Dawka 20 g/ha

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Chwasty wrażliwe        | fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rumianek pospolity, ostróżeczka polna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne |
| Chwasty średniowrażliwe | bodziszek drobny, chaber bławatek, komosa biała, mak polny, przetacznik bluszczokowy, przytulia czepna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata)                                       |
| Chwasty średnioodporne  | jasnota purpurowa   |

## Wrażliwość chwastów w zbożach jarych:

### Dawka 16 g/ha

|                  |   |
|------------------|---|
| Chwasty wrażliwe | fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), samosiewy rzepaku, tobołki polne |
| Chwasty odporne  | przytulia czepna  |

### Dawka 20 g/ha

|                  |   |
|------------------|---|
| Chwasty wrażliwe | fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), samosiewy rzepaku, tobołki polne |
| Chwasty odporne  | przytulia czepna  |

## STOSOWANIE ŚRODKA

| Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime; Pszenica jara, jęczmień jary | Zalecana dawka | Termin stosowania | Max. liczba zabiegów | Ilość wody   | Oprysk           |
|---|----------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------|
|   | 16-20 g/ha     | BBCH 13-39        | 1                    | 200-400 l/ha | średniokroplisty |