

TopGun 050 CS

STOSOWANIE ŚRODKA

		Zalecana dawka	Termin stosowania	Max. liczba zabiegów	Ilość wody	Oprysk
Ziemniak	Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej	0,12-0,16 l/ha	Po wystąpieniu szkodnika	2	300-400 l/ha	średniokroplisty
	Mszyce	0,16-0,2 l/ha	Po wystąpieniu szkodnika	2	300-400 l/ha	średniokroplisty
		Zalecana dawka	Termin stosowania	Max. liczba zabiegów	Ilość wody	Oprysk
Rzepak ozimy	Chowacz brukwiaczek	0,125 l/ha	Przed złożeniem jaj przez chrząszcze	2	300 l/ha	średniokroplisty
	Słodyszek rzepakowy (zabieg ten zwalcza również chowacza czterozębnego)	0,12 l/ha	Po wystąpieniu chrząszczy	2	300 l/ha	średniokroplisty
	Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik	0,125-0,15 l/ha	BBCH 55-69	2	300 l/ha	średniokroplisty
	Pchełka rzepakowa, pchełki ziemne, gnatarz rzepakowiec	0,12-0,15 l/ha	BBCH 10-14	2	300 l/ha	średniokroplisty
		Zalecana dawka	Termin stosowania	Max. liczba zabiegów	Ilość wody	Oprysk
Pszenica ozima, jęczmień jary	Skrzypionki	0,075-0,1 l/ha	Od początku wylęgania się larw	2	300-400 l/ha	średniokroplisty
	Mszyce	0,075-0,1 l/ha	Po wykłoszeniu, nie później niż do fazy młecznicy dojrzłości ziarna	2	300-400 l/ha	średniokroplisty
	Mszyce (wektory chorób wirusowych we wczesnej fazie rozwoju zbóż)	0,075-0,1 l/ha	Zbożu ozimym - jesienią, zbożu jarym - wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc	2	300-400 l/ha	średniokroplisty
		Zalecana dawka	Termin stosowania	Max. liczba zabiegów	Ilość wody	Oprysk
Kukurydza	Omacnica prosowianka	0,2 l/ha	W okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika	2	300-400 l/ha	średniokroplisty
	Mszyce	0,1 l/ha	W okresie masowego nalotu mszyc uskrzydłych	2	300-400 l/ha	średniokroplisty
		Zalecana dawka	Termin stosowania	Max. liczba zabiegów	Ilość wody	Oprysk
Burak cukrowy	Szarek komośnik	0,2 l/ha	wykonać po wystąpieniu szkodnika do fazy BBCH39	2	250-400 l/ha	średniokroplisty
		Zalecana dawka	Termin stosowania	Max. liczba zabiegów	Ilość wody	Oprysk
Jabłoń	Mszyca jabłoniowa	0,15-0,2 l/ha	wykonać po wystąpieniu szkodnika	1	500-750 l/ha	średniokroplisty
		Zalecana dawka	Termin stosowania	Max. liczba zabiegów	Ilość wody	Oprysk
Cebula	Wciornastek tytoniowiec	0,12 l/ha	Po wystąpieniu pierwszych szkodników	2	400-500 l/ha	średniokroplisty
	Śmietka cebulanka	0,12 l/ha	W okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia bzu lilaka	2	400-500 l/ha	średniokroplisty
		Zalecana dawka	Termin stosowania	Max. liczba zabiegów	Ilość wody	Oprysk
Kapusta głowiasta	Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, wciornastek tytoniowiec	0,12 l/ha	Po wystąpieniu szkodnika	2	500-600 l/ha	średniokroplisty
	Śmietka kapuściana	0,12 l/ha	W początkowym okresie kwitnienia kasztanowca	2	500-600 l/ha	średniokroplisty
		Zalecana dawka	Termin stosowania	Max. liczba zabiegów	Ilość wody	Oprysk
Kukurydza cukrowa	Omacnica prosowianka	0,2 l/ha	BBCH 51-53, po wystąpieniu szkodnika	1	300-400 l/ha	średniokroplisty